

2024 年 4 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码:03007

- 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
- 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 急诊患者就诊过程中常常会产生优先感,其原因可能是
 - 拥挤嘈杂的环境导致
 - 认为自己病情最重
 - 会诊和检查的项目多
 - 等候时间过长
- 急诊分诊护士应至少具备的急诊临床护理工作经验年限是
 - 2 年
 - 3 年
 - 4 年
 - 5 年
- 急诊分诊中对于疑似传染病患者的处理,不正确的是
 - 直接转入感染性疾病科
 - 消毒接诊室
 - 直接进入急诊诊治流程
 - 加强患者的宣教
- 胸膜炎患者胸痛加剧的常见诱因是
 - 咳嗽
 - 情绪激动
 - 劳累
 - 翻身
- 患者,男性,34 岁,2 小时前无明显诱因突然出现腹部疼痛,疼痛位于右侧腰部,沿输尿管向下放射至会阴部。患者面色苍白,痛苦不安,伴大汗。尿常规示红细胞满视野。该患者腹痛最可能的病因是
 - 急性阑尾炎
 - 急性胆囊炎
 - 泌尿系结石
 - 急性胰腺炎

6. 院内心搏骤停患者的生存主要取决于
A. 心搏骤停的监测与预防 B. 识别和启动应急反应系统
C. 即时高质量心肺复苏和快速除颤 D. 高级生命维持和骤停后护理
7. 直接参与机体酸碱平衡调节的组织或器官不包括
A. 肺脏 B. 血液
C. 肾脏 D. 肝脏
8. 血清钾浓度的正常值为
A. 1.4~3.4mmol/L B. 3.5~5.5mmol/L
C. 5.6~7.6mmol/L D. 7.7~9.7mmol/L
9. 死亡率最高的休克类型是
A. 低血容量性休克 B. 心源性休克
C. 梗阻性休克 D. 分布性休克
10. 胸外心脏非同步直流电除颤时，双相波除颤仪的除颤电量一般选择
A. 100J B. 150J
C. 200J D. 250J
11. 使用止血带止血时，扎止血带的时间一般应小于
A. 15min B. 30min
C. 1h D. 4h
12. 海平面静息状态下呼吸空气时，提示为Ⅱ型呼吸衰竭的动脉血气分析结果是
A. PaO_2 55mmHg, PaCO_2 30mmHg B. PaO_2 55mmHg, PaCO_2 40mmHg
C. PaO_2 50mmHg, PaCO_2 45mmHg D. PaO_2 50mmHg, PaCO_2 60mmHg
13. 心力衰竭患者心源性猝死发生率明显增加的左心室射血分数（LVEF）界值是
A. 55% B. 45%
C. 35% D. 25%
14. 上消化道出血病因诊断的首选方法是
A. 胃镜检查 B. X线钡剂造影
C. 选择性动脉造影 D. 放射性核素扫描
15. 下列属于下尿路结石的是
A. 肾盂结石 B. 肾盏结石
C. 输尿管结石 D. 膀胱结石
16. 糖尿病酮症酸中毒患者少见但可致命的并发症是
A. 低血糖 B. 低血钾
C. 代谢性酸中毒 D. 脑水肿

17. 低血糖昏迷患者升血糖治疗不宜采用
A. 静脉注射 50%葡萄糖 B. 静脉输注 10%葡萄糖液
C. 皮下注射胰高血糖素 D. 口服补充葡萄糖液
18. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
A. 颅内肿瘤 B. 脑血管畸形
C. 高血压合并动脉硬化 D. 颅内动脉瘤破裂
19. 椎基底动脉系统梗死患者的典型表现为
A. 失语 B. 眩晕
C. 对侧偏瘫 D. 同向性偏盲
20. 提示脑卒中患者出现脑疝的典型临床表现是
A. 头痛 B. 恶心呕吐
C. 呼吸减慢 D. 双侧瞳孔不等大
21. 头颅 CT 发现边界清楚的椭圆形高密度影提示
A. 脑栓塞 B. 脑血栓形成
C. 脑出血 D. 蛛网膜下腔出血
22. 根据新九分法，总面积在 10%~29% 的二度烧伤，其严重度为
A. 轻度烧伤 B. 中度烧伤
C. 重度烧伤 D. 特重度烧伤
23. 决定分娩是否顺利的主要因素不包括
A. 年龄 B. 产力
C. 产道 D. 胎儿
24. 按照损伤部位，眼球穿通伤中最常见的是
A. 角膜穿通伤 B. 角巩膜穿通伤
C. 巩膜穿通伤 D. 眼球壁穿通伤
25. 某患者因生石灰溅入右眼 3 小时来就诊，查体可见右眼角膜缘组织缺血坏死，呈瓷白色混浊，视力严重下降。该患者的病情程度为
A. 轻度损伤 B. 中度损伤
C. 重度损伤 D. 极重度损伤
26. 人体最常见的骨折是
A. 颅骨骨折 B. 鼻骨骨折
C. 颈椎骨折 D. 肱骨骨折
27. 热射病的三联征表现为
A. 高热、无汗、意识障碍 B. 低热、无汗、血压下降
C. 高热、大汗、血压下降 D. 低热、大汗、意识障碍

28. 发生冻僵时，机体中心体温应一般低于
A. 35℃ B. 34℃
C. 33℃ D. 32℃
29. CO 中毒患者频繁抽搐时首选的治疗药物是
A. 纳洛酮 B. 地高辛
C. 地西洋 D. 阿托品
30. 急性酒精中毒患者，出现动作笨拙、步态不稳、语无伦次，提示该患者处于
A. 兴奋期 B. 共济失调期
C. 昏睡期 D. 昏迷期

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 使用自动体外除颤器对心搏骤停患者进行除颤时，正确的操作是
A. 首先应打开开关
B. 按语音提示贴电极片
C. 自动分析心律时不可中断按压
D. 按下除颤按钮前，应提示大家离开患者
E. 除颤后立即给予 5 轮 CPR
32. 下列可导致代谢性碱中毒的病因有
A. 严重腹泻 B. 大量呕吐
C. 大量使用呋塞米利尿 D. 肾上腺皮质激素过多
E. 呼吸中枢抑制
33. 肠梗阻的典型症状包括
A. 腹痛 B. 呕吐
C. 腹胀 D. 排便、排气停止
E. 寒战高热
34. 2 型糖尿病患者发生酮症酸中毒的常见诱因包括
A. 感染 B. 胰岛素过量
C. 饮食不当 D. 胃肠疾病
E. 创伤
35. 脑栓塞常见的栓子来源有
A. 心房附壁血栓 B. 癌栓
C. 下肢静脉血栓 D. 脂肪栓
E. 动脉粥样硬化斑块

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。


36. 简述稽留热的特点及常见原因。
37. 简述高质量胸外按压的标准。
38. 简述洋地黄中毒的临床表现及处理。
39. 简述癫痫发作的共性特征。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 试述损伤急救中止血的方法及适应证。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 某急性心肌梗死患者拟行急诊冠状动脉支架成形术（PCI），在送往导管室途中，患者突然出现双眼凝视、全身抽搐，心电示波如题 41 图所示：



题 41 图

请写出：

- (1) 该患者双眼凝视和全身抽搐最可能的原因；
(2) 现场 2 名医务人员应立即采取的急救措施。
42. 患者，男性，28 岁，消化性溃疡病史 3 年。今日晨起出现呕吐咖啡色胃内容物，量约 400ml，解柏油样大便 4 次，量约 700 克，感头晕、大汗，立即被送来医院。体格检查：T 37.8℃ P 128 次/分 R 24 次/分 BP 85/50mmHg，神清合作，面色苍白，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌、蜘蛛痣，双肺呼吸音清晰，心界不大，心率 128 次/分，节律齐，未闻及杂音，腹软，剑突下压痛，无反跳痛，肝、脾未扪及。肠鸣音 18 次/分，移动性浊音阴性。四肢冷，膝反射正常。实验室检查：血常规 Hb 65g/L，WBC $9.0 \times 10^9/L$ 。

请写出：

- (1) 该患者可能出现的消化性溃疡的并发症；
(2) 针对该患者应立即采取的急救护理措施。